

Butasiv

Butamirate Citrate

Julphar

Bangladesh

Composition:

Butasiv 50 Tablet: Each film coated tablet contains Butamirate Citrate INN 50 mg.

Butasiv Syrup: Each 5 ml syrup contains Butamirate Citrate INN 7.5 mg.

Description:

Butasiv (Butamirate Citrate) acts directly on the brain's cough center to suppress cough. **Butasiv** (Butamirate Citrate) is safe and non-sedating which is neither chemically nor pharmacologically related to opium alkaloids. **Butasiv** is rapidly and completely absorbed after oral administration. **Butasiv** is extremely protein bound drug and its plasma elimination half life is about 13 hours. The active metabolites of **Butasiv** have also antitussive action.

Indications:

Butasiv (Butamirate Citrate) is used to relieve dry (non-productive) cough. **Butasiv** (Butamirate Citrate) is also used for pre & post-operative cough sedation in patients who will undergo surgical procedures and bronchoscopy. It can be used in acute cough of any etiology, whooping cough and cough due to acute lower respiratory tract infections (tracheitis, laryngitis, bronchitis etc.)

Dosage & Administration:

Butasiv 50 Tablet: Adults: 2-3 tablets daily.

Adolescent over 12 years old: 1-2 tablets daily.

Butasiv Syrup: Children (3-6 yrs) – 5 ml 3 times

daily, Children (6-12 yrs) – 10 ml 3 times daily;

Adolescent – 15 ml 3 times daily; Adults – 15 ml 4

times daily.

OR AS DIRECTED BY THE PHYSICIAN.

Side Effects:

Tolerance of Butamirate Citrate is good. Adverse reactions such as rash, nausea, diarrhoea and vertigo have been observed in a few rare cases, resolving after dose reduction or treatment withdrawal.

Use in Pregnancy & Lactation:

Butamirate Citrate should not be used during the first trimester of pregnancy. During the remainder of pregnancy, it can be used if indicated by a physician but with caution. As a general rule, for safety reasons, in the absence of data on elimination of the active substance in breast milk, the benefits of Butamirate Citrate administration during breast feeding should be carefully weighed against the risks.

Contraindications:

Hypersensitivity to or any of the ingredients.

Storage Condition:

Keep in a cool and dry place, protect from light.

Keep out of the reach of children.

Presentation:

Butasiv 50 Tablet: Each box contains 3x10's tablets in blister pack.

Butasiv Syrup: Each carton contains a bottle having 100 ml syrup.

Manufactured by:
Julphar Bangladesh Ltd.

Sreepur, Gazipur, Bangladesh.

91214152

বিউটাসিভ

বিউটামিরেট সাইট্রেট

Julphar

Bangladesh

উপাদানঃ

বিউটাসিভ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে বিউটামিরেট সাইট্রেট আইএনএন ৫০ মি.গ্রা.।

বিউটাসিভ সিরাপ: প্রতি ৫ মি. লি. সিরাপে আছে বিউটামিরেট সাইট্রেট আইএনএন ৭.৫ মি.গ্রা.।

বর্ণনাঃ

বিউটাসিভ (বিউটামিরেট সাইট্রেট) মস্তিষ্কের কফ সেন্টারে সরাসরি কাজ করে। **বিউটাসিভ** (বিউটামিরেট সাইট্রেট) নিরাপদ এবং নন-সিডেটিভ যা রাসায়নিকভাবে বা ফার্মাকোলজিক্যালি অপিয়াম অ্যালকালয়েডের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। মুখে খাওয়ার পর **বিউটাসিভ** দ্রুত এবং সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়। **বিউটামিরেট সাইট্রেট** এর প্রোটিন বন্ধন ক্ষমতা বেশী এবং প্লাজমা নিঃসরণ হাফ-লাইফ হচ্ছে ১৩ ঘন্টা। **বিউটামিরেট সাইট্রেট** এর বিপাকীয় দ্রব্যেরও কফ নিরোধক ক্ষমতা আছে।

নির্দেশনাঃ

বিউটাসিভ (বিউটামিরেট সাইট্রেট) শুষ্ক কফ (নন-প্রোডাক্টিভ) এর জন্য নির্দেশিত। অপারেশনের আগে ও পরে কফ নিরোধে এবং ব্রংকোস্কোপিতেও **বিউটাসিভ** (বিউটামিরেট সাইট্রেট) নির্দেশিত। এছাড়া যেকোন রোগ হতে সৃষ্ট তাৎক্ষণিক কফ, নিম্ন শ্বাসনালীর সংক্রমণ জনিত ট্র্যাকিয়াইটিস, ল্যারিনজাইটিস, ব্রংকাইটিস) কফে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা এবং সেবন বিধিঃ

বিউটাসিভ ৫০ ট্যাবলেট: বয়স্কদের জন্য: ২-৩ টি ট্যাবলেট।

১২ বছরের বেশী বাড়ন্তদের জন্য : প্রতিদিন ১-২ টি ট্যাবলেট।

বিউটাসিভ সিরাপ :

শিশু (৩-৬ বছর): ৫ মি. লি. করে দিনে ৩ বার।

শিশু (৬-১২ বছর): ১০ মি. লি. করে দিনে ৩ বার।

বয়ঃসন্ধিকালে: ১৫ মি. লি. করে দিনে ৩ বার।

প্রাপ্ত বয়স্ক: ১৫ মি. লি. করে দিনে ৪ বার।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবনযোগ্য।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

বিউটামিরেট সাইট্রেট খুবই সহনীয়। কখনও কখনও ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ঝাপসাভাব এর রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মাত্রা কমালে বা ওষুধ সেবন বন্ধ করলে এ সকল প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হয়।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীনঃ

বিউটামিরেট সাইট্রেট গর্ভাবস্থায় প্রথম তিনমাস ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভকালীন বাকি সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু মাতৃদুগ্ধে কার্যকরী উপাদানের নিঃসরণের উপর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, সেহেতু সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুবিধা সম্ভাব্য ঝুঁকি হতে অধিকতর বিবেচিত হলে স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনাঃ

বিউটামিরেট সাইট্রেট অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না।

সংরক্ষণঃ

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

উপস্থাপনাঃ

বিউটাসিভ ৫০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বক্সে আছে ৩x১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

বিউটাসিভ সিরাপঃ প্রতি কার্টনে আছে ১০০ মি. লি. সিরাপ কাঁচের বোতলে।

প্রস্তুতকারকঃ

জুলফার বাংলাদেশ লিমিটেড

শ্রীপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।